

第5章

資料2 使用上の注意 頻出まとめ

※この表はすべての成分を網羅していません。手引きの別表5-1と5-2をご参照の上、ご活用ください。

イブプロフェン

| | | |
|---------------------------|------------------|--|
| してはいけないこと：次の人は使用（服用）しないこと | アレルギーの既往歴 | 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬 を使用（服用）して ぜんそく を起こしたことがある人 |
| | 小児における年齢制限 | 15歳未満 の小児 |
| | 妊婦、授乳婦等 | 出産予定日 12週 以内の妊婦 |
| 相談すること | 妊婦又は妊娠していると思われる人 | |
| | 基礎疾患等 | <u>次の診断を受けた人</u> 肝臓病、心臓病、腎臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病 |

ブソドエフェドリン

| | | |
|---------------------------|-----------|--|
| してはいけないこと：次の人は使用（服用）しないこと | アレルギーの既往歴 | 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 |
| | 症状・状態 | <u>次の症状がある人</u> 前立腺肥大 による排尿困難 |
| | 基礎疾患等 | <u>次の診断を受けた人</u> 心臓病、高血圧、甲状腺機能障害、糖尿病 |
| 相談すること | 授乳中の人 | |
| | 基礎疾患等 | <u>次の診断を受けた人</u> 腎臓病 |
| | 併用薬等 | モノアミン酸化酵素阻害剤 （セレギリン塩酸塩 等）で治療を受けている人 |

ジプロフィリン

| | | |
|--------|-------|--|
| 相談すること | 基礎疾患等 | <u>次の診断を受けた人</u> てんかん、甲状腺機能障害、甲状腺機能亢進症、心臓病 |
|--------|-------|--|

カフェイン

| | | |
|-----------|----------------|--|
| してはいけないこと | 症状・状態 | <u>次の人は使用（服用）しないこと：次の症状がある人</u> 胃酸過多 |
| | 基礎疾患等 | <u>次の人は使用（服用）しないこと：次の診断を受けた人</u> 心臓病、胃潰瘍 |
| | 食品との相互作用に関する注意 | コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないこと |
| | 連用に関する注意 | 眠気防止薬「短期間の服用にとどめ、連用しないこと」 |
| 相談すること | 授乳中の人 | 乳児に 頻脈 や不眠等を引き起こすおそれ |

芍薬甘草湯

| | | |
|-----------|----------|--|
| してはいけないこと | 基礎疾患等 | <u>次の人は使用（服用）しないこと：次の診断を受けた人</u> 心臓病 |
| | 連用に関する注意 | 症状があるときのための服用にとどめ、連用しないこと |

第5章

資料2 使用上の注意 頻出まとめ

アルミニウム含有成分（スクラルファート、ケイ酸アルミン酸マグネシウム、合成ヒドロタルサイト、アルジオキサ等）

| | | |
|---------------------------|-------|--------------------------|
| してはいけないこと：次の人は使用（服用）しないこと | 基礎疾患等 | 次の診断を受けた人 透析療法を受けている人 |
| 相談すること | 基礎疾患等 | 次の診断を受けた人 腎臓病 |

アミノ安息香酸エチル

| | | |
|---------------------------|------------|------------------------------|
| してはいけないこと：次の人は使用（服用）しないこと | 小児における年齢制限 | 6歳未満の小児：メトヘモグロビン血症を起こすおそれがある |
|---------------------------|------------|------------------------------|

リゾチーム塩酸塩

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|
| してはいけないこと：次の人は使用（服用）しないこと | アレルギーの既往歴 | 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|

タンニン酸アルブミン、カゼイン等（添加物）

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|
| してはいけないこと：次の人は使用（服用）しないこと | アレルギーの既往歴 | 本剤又は本剤の成分、牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|

してはいけないこと：授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| ジフェンヒドラミン塩酸塩など | 乳児に昏睡を起こすおそれがある |
| アミノフィリン水和物、テオフィリン | 乳児に神経過敏を起こすことがある |
| ロートエキス | 乳児に頻脈を起こすおそれがある |
| センノシド、センナ、ダイオウ、カサントラノール、ヒマシ油類 | 乳児に下痢を起こすおそれがある |
| コデイン類 | 乳児でモルヒネ中毒が生じたとの報告がある |

してはいけないこと：服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| 抗ヒスタミン成分（ジフェンヒドラミン塩酸塩等） | 眠気等の懸念 |
| コデイン類 | |
| 催眠鎮静薬（プロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素） | |
| 止瀉薬（ロペラミド塩酸塩、ロートエキス） | |
| 抗コリン薬（スコポラミン臭化水素酸塩水和物等） | 眠気、目のかすみ、異常なまぶしさの懸念 |